



За здрави стави!

## Картилазин® глјос

Глукозамин сулфат 500 mg  
Хондроитин сулфат 200 mg  
Витамин С 60 mg



За здрави стави!

## Картилазин® глјос

Глукозамин сулфат 500 mg  
Хондроитин сулфат 200 mg  
Витамин С 60 mg

40 таблети

40 таблети

**Картилазин® глјос** е висококачествен съвременен продукт от естествен производ, който съдържа Глукозамин сулфат (извлечен от морски продукти), Хондроитин сулфат и Витамин С.

Ставният хрущял изпълнява функцията на гладка, смазваща се повърхност, която поема и смекчава триенето и натоварването в ставата. Промени в резултат на травма, остеоартрит и други дегенеративни процеси изменят нормалната зависимост между структурата и функциите на ставния хрущял.

Обогатената комбинация от три необходими за ставата съединения има много важно значение за:

- Облекчаване на болката, свързана с пренатоварване на ставите или износване на ставния хрущял;
- Увеличаване на ставната подвижност;
- По-бързото възстановяване на меките тъкани след ставни травми - навяхване, изкълчване;
- Профилактика на преждевременното износване на ставния хрущял при активно спортуващи.

Състав	Съдържание на една таблетка	Състав на препоръчителна дневна доза
Глукозамин сулфат	500 mg	1000 mg
Хондроитин сулфат	200 mg	400 mg
Витамин С	60 mg	120 mg

### Глукозамин сулфат

Глукозаминът нормално се образува в организма от глюкоза и аминокиселината глутамин. Той е главен компонент на ставния хрущял, сухожилията и връзките.

- Стимулира формирането на хрущялния матрикс, улеснява продукцията на глюкозаминогликани и протеогликани от хрущялните клетки;
- Намалява хиалуронидазата - ензим, който уврежда тъканите;
- Подобрява смазочните свойства на синовиалната течност;
- Подпомага възстановяването на увредения ставен хрущял и подвижността на ставите;
- Притежава умерен противовъзпалителен ефект;
- Глукозамин поддържа ставния хрущял и ставната течност и препятства промените в ставите, които настъпват с възрастта;
- Подпомага също възстановяването след травми на меките тъкани;
- Положителният му ефект продължава поне два месеца след приключване на приема.

### Хондроитин сулфат

Хондроитинът се синтезира в организма от глукозамин и също е главна съставка на ставния хрущял.

Специална грижа

actahelp



За здрави стави!

## Картилазин® плюс

Глюкозамин сулфат 500 mg  
Хондроитин сулфат 200 mg  
Витамин С 60 mg



- Доставя градивни елементи за изграждането и възстановяването му;
- Осигурява неговата еластичност и здравина;
- Блокира ензимите, които разграждат ставния хрущял;
- Повишава нивото на хиалуроновата киселина в ставите (хиалуроновата киселина е смазочната течност в ставата, прави ставните повърхности хлъзгави и ги предпазва от нараняване при триене);
- Притежава умерен противовъзпалителен ефект.

Ефектът на комбинацията Глюкозамин и Хондроитин в **Картилазин® плюс** превъзхожда действието им, ако се приемат поотделно.

### Витамин С

- Има предпазен ефект при възпалителни процеси;
- Играе жизнено важна роля при формирането на хрущяла и здравината на ставите;
- Действа в организма като мощен антиоксидант, който свързва и отнема освободените при възпалителния процес свободни радикали.

Хората, които не приемат достатъчно количество Витамин С, са изложени трикратно по-често на риск от остеоартроза в сравнение с тези, които приемат високи дози.

### Приложение на **Картилазин® плюс**

**Картилазин® плюс** е подходящо средство за профилактика и като добавка към основното лечение на остеоартроза, артралгии, травми на меките тъкани:

- За забавяне увреждането на ставния хрущял с напредване на възрастта;
- За профилактика на преждевременното износване на ставния хрущял при усилени ставни натоварвания при спортисти;
- За подобряване функцията на ставите и подпомагане облекчаването на ставните болки, свързани както с възрастови така и с травматични промени;
- За по-бързото възстановяване на меките тъкани след ставни травми - навяхване, изкълчване;
- За потенциране и допълване на противовъзпалителния и обезболяващ ефект на нестероидните противовъзпалителни средства при гореуказаните състояния.

**Начин на употреба:** по 2 таблетки дневно, по време на хранене.

Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Препоръчва се да се приема в продължение на 2-3 месеца.

**Картилазин® плюс** не може да бъде използван като заместител на разнообразното хранене.

**Съхранение:** При температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

### Производител:

Балканфарма-Дупница АД,  
ул. „Самоковско шосе“ № 3  
2600 Дупница, България  
тел.: 0701 58 196  
факс: 0701 58 555

Специална грижа

actahelp