

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

MUCOLISIN

МУКОЛИЗИН

СЪСТАВ

Лекарствено вещество в 5 ml (една дозировъчна чашка): Ambroxol hydrochloride 30 mg

Помощни вещества: сорбитол, глицерол, бензоена киселина, захарин, ароматизатор ягода, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Муколизин сироп 30 mg/5ml, 100 ml в стъклена бутилка, дозировъчна лъжичка 5 ml

Муколизин сироп 30mg/5ml, 100 ml в бутилка от полиетилентерефталат, дозировъчна лъжичка 5 ml

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН АД

5600, гр.Троян, ул."Крайречна" № 1

Тел.: (0670) 22607

ДЕЙСТВИЕ

Муколизин втечнява бронхиалния секрет, засилва ефекта на ресничките на бронхиалната лигавица, което води до улеснено отделяне на секрета.

ПОКАЗАНИЯ

Муколизин се прилага за краткотрайно лечение на остри и обострени хронични заболявания, протичащи със съгъстяване на бронхиалния секрет като:

- бронхит;
- бронхиална астма със затруднено отделяне на секреция;
- бронхиектазии;
- за втечняване на бронхиалния секрет при възпалителни заболявания в областта на носоглътката.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Муколизин не се прилага при пациенти, свръхчувствителни към лекарственото вещество или някое от помощните вещества.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

При пациенти с нарушение на двигателната функция на бронхите (при редкия злокачествен синдром на ресничките), **Муколизин** трябва да се прилага с повишено внимание поради риск от задръжка на секрета.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Комбинирането на **Муколизин** с други *противокашлични средства* може да доведе до опасно задържане на бронхиален секрет, поради потискане на рефлекс за кашляне. Показанията за прилагане на комбинирано лечение трябва да се преценяват с повишено внимание.

При едновременно приемане с **Муколизин** антибиотиките *амоксицилин, цефуроксим и еритромицин* проникват в по-голяма степен в бронхиалния секрет.

Няма информация за взаимодействието на **Муколизин** с други лекарствени средства, които се използват за лечение на бронхитен синдром.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

Муколизин не трябва да се приема по време на бременността, особено в първите три месеца. Продуктът преминава в кърмата, но е малко вероятно в терапевтични дози да повлияе на кърмачето.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Няма данни за повлияване на способността за шофиране и работа с машини.

ДАННИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Продуктът съдържа сорбитол, който е неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза, тъй като може да причини стомашно дразнене и диария.

Продуктът съдържа глицерол, който може да причини, главоболие, стомашно дразнене и диария.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА

Без лекарско предписание при възрастни и деца над 2 години!

В случай, че не е предписано друго:

Възрастни и деца над 12 години: 2 пъти по 10 ml (две доз. лъжички);

Деца от 6 до 12 години: 2-3 пъти по 5 ml (1 доз. лъжичка);

Деца от 2 –6 години: 3 пъти по 2,5 ml (1/2 доз. лъжичка).

По лекарско предписание при деца под 2 години!

Деца под 2 години: 2 пъти по 2,5 ml.

При малки деца под 1 година не се препоръчва даването на Муколизин, поради невъзможност за отхрачване. Преценката трябва да бъде извършена от лекар.

Продължителността на лечението се определя индивидуално, в зависимост от показанията и тежестта на заболяването. Курсът на лечение не трябва да надвишава 5-7 дни.

Ефектът на продукта се засилва при приемане на повече течности.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

При предозирание с **Муколизин** се наблюдават гадене, повръщане, зачервяване на гърлото и стомашна или коремна болка. По-рядко може да настъпи спадане на кръвното налягане. Като първа мярка в лечението на отравянето е предизвикване на повръщане и приемане на течности (чай, мляко). Ако продуктът е приет преди по-малко от 1-2 часа, подходящо е прилагането на стомашна промивка.

Болният трябва да се постави под наблюдение.

Муколизин не се отстранява добре чрез усилена диуреза и хемодиализа.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

В редки случаи при лечение с **Муколизин** могат да се наблюдават *реакции от страна на стомашно-чревния тракт* (гадене и коремна болка) и *алергични реакции* (обрив по кожата, подуване на лицето, тежко нарушение на дихателната функция, повишаване на температурата с втрисане). Възможен е слабителен ефект, поради съдържание на сорбитол и глицерол, като помощни вещества.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

2 (две) години.

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Годен за употреба 30 дни след първото отваряне на опаковката!

ДАТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

Март, 2002 г.