

БЕНЕУРИН обвити таблетки

BENEURIN coated tablets

Състав:

Всяка таблетка съдържа: Thiamine nitrate 15 mg, Pyridoxine hydrochloride 10 mg, Суанособаламин 0,02 g и помощни вещества до 150 mg.

Действие

АТС vet Code: Q A 1 1 D B

Активните съставки на БеНеурин обвити таблетки – тиамин нитрат, пиримидин хидрохлорид и цианокобаламин – влизат като коензими в комплекса от ензимни системи, регулиращи обмяната на въглехидратите, мазнините и белтъчините. Витамин В₁ като тиамин пирофосфат (кокарбоксилаза) се изразходва усилено при приемане на повече въглехидрати, тъй като участва активно в техния метаболизъм. При хипо- и авитаминоза В₁ той подобрява бързо функцията на нервната система и води до ограничаване или изчезване на полиневритните прояви. Витамин В₆ спомага за използване от организма на ненаситените мастни киселини и за преаминиране на някои аминокиселини, подобряване функцията на черния дроб, нервната система и кръвотворните органи. Витамин В₁₂ участва предимно в белтъчната обмяна и при синтеза на съединения с подвижна метилна група (холин, метионин) и на нуклеинови киселини. Усилва регенеративните процеси и растежа на младите животни, влияе благоприятно върху функцията на нервната система, оказва антидистрофичен ефект на черния дроб, подобрява функцията на храносмилателната система и действа благоприятно на кожата и половата система.

Терапевтични показания

За лечение на хипо- и авитаминози В₁, В₆ и В₁₂ при кучета и котки; на възпалителни и дегенеративни процеси на периферните нерви – неврити, полиневрити, невралгии, парестезии, парези и парализи; на сидеробластна,

хипопластична, макроцитарна и хипохромна анемия; на агранулоцитоза; на астения и миастения; на алергични страдания; на себороични дерматити, екземи; на чернодробни заболявания, интоксикации; при вътрешно прилагане на антибиотици (особено с широк спектър на действие) и други химиотерапевтици.

Противопоказания за употреба

При свръхчувствителност към някое от активните или помощните вещества.

Начин на приложение

Вътрешно чрез директно поставяне на таблетката върху основата на езика или с помощта на малко количество любима храна (като примамка). При отказ, таблетката се стрива на прах и се посипва върху или се смесва с храната.

Дозировка

За гигантски породи кучета (над 45 kg маса в зряла възраст) – по 5 - 6 ½ таблетки дневно; за едри породи кучета (26 – 44 kg маса) – по 3 – 5 ½ таблетки дневно; за средни породи кучета (11 – 25 kg маса) – по 2 – 3 ½ таблетки дневно; за дребни породи кучета (5 – 10 kg маса) – по 1 – 2 ½ таблетки дневно; за много дребни породи кучета (до 5 kg маса) – по ½ - 1 таблетка дневно; за котки с маса над 3 kg – по ½ - 2 таблетки дневно; за котки с маса до 3 kg – по 1/3 до 1 таблетка дневно.

Странични реакции

Не са наблюдавани.

Начин на отпускане

Само по лекарско предписание.

Лекарствени и други форми на взаимодействие

Не са известни.

Срок на годност

3 години.

Съхранение

При температура под 25 °С. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Опаковка

Един блистер от 30 таблетки, заедно с листовка за употреба, се поставя в картонена кутия.

Номер на лиценза за употреба

№ 616/ 14.07.2006 г.

Производител и притежател на лиценза за употреба

„Балканфарма-Дупница” АД, ул. „Самоковско шосе” No 3, 2600 Дупница,
България