

## **ГЕНТАКУЛИН 0,3 % ОЧНА МАЗ**

## **GENTACULIN 0,3 % OPHTHALMIC OINTMENT**

### **Gentamicin**

#### **Състав**

Gentamicin (като сулфат) 3 mg и помощни вещества до 1 g.

#### **Действие**

АТС vet Code: Q S 0 1 A A 1 1

Гентамицинът е аминокликозиден антибиотик с активност предимно срещу Грам-отрицателни и някои Грам-положителни аеробни микроорганизми – колибактерии, протеуси, *Pseudomonas aeruginosa*, шигели, клебсиели, пастъорели, салмонели, бруцели, кампилобактерии, листерии, стафилококи, стрептококи, микоплазми, вибриони и др. Действа бактерицидно чрез инхибиране на белтъчния синтез на рибозомно разнище. Активен е както в логаритмичната, така и в стационарната фаза от развитието на микроорганизмите, като по-висока е активността му във фазата на усилен растеж и в леко алкална среда. Ефектът е концентрация-зависим, с ясно изразен постантибиотичен ефект. Активен е срещу почти причинители на очни заболявания при кучета и котки.

#### **Терапевтични показания**

Препаратът е предназначен за употреба при кучета и котки за локално лечение на конюнктивити, блефарити, блефароконюнктивити, кератити, хордеолуми, дакриоцистити, пълзяща язва на роговицата, вторични инфекции при ерозии и язви на роговицата, включително при херпес на същата; профилактично след екстракция на чужди тела от роговицата и конюнктивата; предоперативно и следоперативно при екстра- и интрабулбарни операции.

#### **Противопоказания за употреба**

Свръхчувствителност към аминокликозидни антибиотици.

### **Нежелани реакции**

Могат да се наблюдават преходно зачервяване на очните лигавици и алергични прояви. При продължително приложение са възможни суперинфектни състояния (прекомерно развитие на нечувствителни микроорганизми – гъбички и др.). В такива случаи медикацията се прекратява и се провежда подходящо лечение. Затова третирането с Гентакулин 0,3 % очна маз се ограничава до не повече от 7-10 дни.

### **Лекарствени и други форми на взаимодействие**

Налице е синергизъм в действието на гентамицина с бета-лактамните антибиотици и ванкомицина.

### **Начин на приложение**

Външно в долния конюнктивален сак. Конусът на тубата да не се допира до очните тъкани.

### **Дозировка**

Стълбче от унгвента с дължина около 10 mm се изстиска в долния конюнктивален сак, 2-3 пъти дневно. Лечението продължава от 4 до 10 дни.

### **Специални предпазни мерки при употреба на препарата**

Не се изискват.

### **Съхранение**

При температура под 25 °С. Да не се замразява. Да се пази на място, недостъпно за деца!

### **Срок на годност**

3 години.

**Срок на годност след първо отваряне на тубата**

30 дни при температура под 25 °С.

**Начин на отпускане**

Само по лекарско предписание.

**Специални мерки за обезвреждане на празни опаковки и неизползван продукт, ако има такива**

Празните опаковки, неизразходван продукт или продукт с изтекъл срок на годност се унищожават според изискванията на местното законодателство

**Опаковка**

Алуминиеви туби с наконечник, затворени с пластмасова капачка, по 5 g.

**Номер на лиценза за употреба**

584/ 08.06.2006

**Производител и притежател на лиценза за употреба**

Балканфарма-Разград АД

Бул. „Априлско въстание”N° 68

7200 Разград, България