

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**RUTASCORBIN®**

**РУТАСКОРБИН**

### **СЪСТАВ**

Активни вещества в 1 филмирана таблетка:

Rutoside - 20 mg, Ascorbic acid- 100 mg .

Помощни вещества: хидроксипропилцелулоза, коповидон, кросповидон, талк, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, безводен колоиден силиций, динатриев едетат.

Филмово покритие: еудражит, талк, титаниев диоксид, макрогол, полисорбат, Е110.

### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Филмирани таблетки по 100 бр. в тъмна стъклена банка, поставена в картонена кутия.

### **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

БАЛКАНФАРМА - ДУПНИЦА АД

гр. Дупница ул. "Самоковско шосе" N 3,

Тел. 0701/2 42 81; 2 90 21/29

### **ДЕЙСТВИЕ**

Рутозидът участва в клетъчните окислително-възстановителни процеси и стабилизира клетъчната мембрана и капилярната стена. Предпазва от кръвоизливи; притежава противовъзпалителен и антиалергичен ефект. Аскорбиновата киселина играе важна роля в жизнените процеси на организма като универсален активатор на клетъчния метаболизъм.

### **ПОКАЗАНИЯ**

Симптоматично лечение в комплексната терапия при:

- заболявания, свързани с повишена пропускливост и чупливост на капилярите; кръвоизливи в кожата, лигавиците и ретината, паренхимни

кръвоизливи; глаукома (повишено вътреочно налягане), хематурия (кръв в урината), алергични и възпалителни реакции, атеросклероза;

- лечение и профилактика на засягане на капилярите (малките кръвоносни съдове) от медикаменти (аспирин, индометацин, фенилбутазон, антикоагуланти, противосъсирващи средства, арсенови съединения, златни соли и др.), които намаляват капилярната устойчивост.

## ***ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ***

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Свръхчувствителност към активните и/или някое от помощните вещества.

Продуктът не бива да се прилага при повишена съсирваемост на кръвта при болни с изкуствени сърдечни клапи, склонност към тромбози и тромбофлебит, диабет, хемохроматоза, таласемия, дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа, тежки нарушения на чернодробната и/или бъбречна функции;.

### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

Да не се приема от болни, които провеждат основно лечение с антикоагуланти (хепарин, антикумарол) и антиагреганти (аспирин, антистенокардин тиклинидин), както и при болни с доказана хипероксалурия и наличие на оксалатни конкременти в бъбреците и пикочните пътища.

### **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Рутаскорбин може да се употребява съвместно с други средства укрепващи капилярите и вените, с противовъзпалителни продукти и продукти намаляващи мастите.

Рутаскорбин може да намали излъчването от организма на барбитурати и да засили седативния им ефект. Аскорбиновата киселина може да разруши витамин В<sub>12</sub> в храносмилателния тракт, поради което трябва да се приема

най-малко 2 часа преди или след хранене. Може да намали токсичните ефекти на дисулфирам.

Може да намали ефекта от лечението с антикоагуланти и антиагреганти.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННО И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ**

Поради липса на данни за безопасността на продукта по време на бременност и кърмене, употребата му не е препоръчителна.

### **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Няма данни за неблагоприятно повлияване на активното внимание, рефлексите и двигателната активност.

### **ДАНИИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Продуктът съдържа оцветител Е 110, който може да причини алергичен тип реакции, вкл. астматичен пристъп. Рискът от алергии е по-голям при алергични към аспирин пациенти.

### ***ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА***

#### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Приемат се от 1 до 3 таблетки 3 пъти дневно, максимално до 2-3 таблетки 3 пъти дневно след хранене, през устата. Продължителността на непрекъснатото лечение е обичайно до 6 седмици и по изключение (по лекарска препоръка) с по-голяма продължителност.

#### **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ**

Макар и рядко предозирание може да възникне при индивидуална свръхчувствителност и/или при поемане на дози по-високи от 1000 -1500 мг (10-15 табл). Приемът на по-висока доза може да предизвика повишена съсирваемост на кръвта; склонност към тромбозирание; безпокойство, безсъние, главоболие, повишаване на кръвното налягане; диария, захар в урината. При поява на някои от посочените болестни прояви, лечението с продукта следва да се преустанови и да се осъществи консултация с лекар. Лечението е симптоматично и се провежда от лекар, с предварителни мерки

за намаляване резорбцията на продукта- стомашна промивка, активен въглен.

### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

По време на лечението с продукта могат да се появят леки стомашно-чревни оплаквания, най-често гадене, което налага прием след ядене.

Много рядко могат се наблюдават реакции от страна на кожата: обриви и сърбеж.

### **СЪХРАНЕНИЕ**

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C

**Да се пази на място, недостъпно за деца.**

### **СРОК НА ГОДНОСТ**

4 (четири) години от датата на производство.

### **ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ**

Ноември, 2001 г.