

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

FELORAN® 1 %

ФЕЛОРАН 1 %

60 g гел

СЪСТАВ:

100 g гел съдържат 1 g Diclofenac sodium.

Помощни вещества: карбомер, макрогол 400, пропиленгликол, натриев бензоат, етанол, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА:

Гел 1%, 60 g в алуминиеви туби.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

Балканфарма-Троян АД

5600 Троян, България, ул. Крайречна № 1

ДЕЙСТВИЕ:

Фелоран гел притежава изразени противовъзпалителни, противоревматични и противооточни свойства. След втриване гелът прониква лесно в кожата и подкожните тъкани като намалява възпалението и болката при движение.

ПОКАЗАНИЯ:

- Болки и възпаления след травми (навяхвания, изкълчвания, счупвания);
- Ограничени форми на ревматизъм на меките тъкани (тендинити, синовити, бурсити, плексити, рамо-ръка синдром, периартрит);

- Изолирани форми на дегенертивни ставни заболявания (остеоартроза на периферни стави и гръбначен стълб).

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Лекарството не се прилага при свръхчувствителност (алергия) към лекарственото или помощните вещества.
- Фелоран гел не се прилага върху открити рани, лигавици, устна кухина, очи.

СПЕЦИАЛНА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:

Прилага се само върху кожа с ненарушена цялост.

Болните с чернодробни и бъбречни заболявания, тези с язва на стомаха или дванадесетопръстника трябва да ограничават продължителната употреба на лекарството, особено върху големи кожни участъци.

Фелоран гел се прилага с повишено внимание при болни с алергия към аспирин и нестероидни противовъзпалителни средства (индометацин, ибупрофен и др.), при бронхиална астма, сенна хрема, алергичен конюнктивит.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Ако приемате други лекарства или желаете да приемате такива в хода на лечението с Фелоран гел е необходимо да се консултирате с Вашия лекар.

Може да се прилага в комплексно лечение с таблетната форма на лекарството.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННО И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ:

Фелоран гел не трябва да се употребява от бременни жени, поради липса на достатъчен клиничен опит, доказващ неговата безвредност. Кърменето трябва да се преустанови по времето на лечение с лекарството.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ:

Не повлиява активното внимание и може да се прилага при шофьори и лица, работещи с машини.

ДАНИИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА:

Фелоран гел съдържа натриев бензоат и пропилен гликол като помощни вещества, които могат да окажат дразнещо действие върху кожата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Възрастни

Фелоран гел е предназначен за приложение върху кожата.

Прилага се 3-4 пъти дневно посредством леко втриване върху засегнатия участък. Количеството за едно приложение се определя в зависимост от големината на участъка, който ще се третира; 2 - 4 g гел (това количество е с приблизителен размер на череша или неголям орех) са достатъчни за третиране на кожна повърхност с размери 400 – 800 см².

Продължителността на лечението не трябва да надвишава 14 дни.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ:

Няма данни за случаи на предозирание при използване на лекарството, съгласно препоръките. Възможно е поглъщане по невнимание или попадане на гел върху лигавици, в устната кухина или очите.

При поглъщане могат да се наблюдават парене в устната кухина, слюноотделяне, гадене, повръщане. В тези случаи е необходимо промиване на устната кухина и стомаха, при нужда симптоматично лечение, което се провежда от лекар.

При попадане в очите, върху лигавици или открити рани се наблюдава местно дразнене – сълзотечение, зачервяване, парене, болка; мерки – обилно промиване на засегнатия участък с дестилирана вода или физиологичен разтвор до изчезване или намаляване на оплакванията.

Във всеки един от тези случаи е необходимо да се обърнете за съвет към Вашия лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ:

Много рядко могат да се наблюдават сърбеж, зачервяване, обриви, парене или дразнене на мястото на приложение. При тези оплаквания е необходимо е да преустановите веднага употребата на лекарството и да се обърнете за съвет към лекар.

СЪХРАНЕНИЕ:

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 оС.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ:

2 (две) години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката!

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА:

м. март 2001 г.