

ТОБРАКУЛИН 0,3 % капки за очи, разтвор

TOBRACULIN 0,3 % eye drops, solution

Tobramycin

Състав

Tobramycin (като сулфат) 3 mg и помощни вещества до 1 ml.

Действие

ATC vet Code: Q S 0 3 3 A A.

Тобрамицинът е антибиотик от групата на аминогликозидите. Притежава широк спектър на антибактериално действие. Активен е предимно срещу Грам-отрицателни и някои Грам-положителни аеробни микроорганизми – *Escherichia coli*, *Pseudomonas*, *Proteus* (индол-положителни и индол-отрицателни), *Klebsiella*, *Shigella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Providentia*, *Citrobacter*, *Staphylococcus aureus* (коагулазо-положителни и коагулазо-отрицателни, включително пеницилиназопродуциращи). Малко активен е срещу стрептококи и ентерококи. Действа бактерицидно чрез инхибиране на белтъчния синтез на рибозомно равнище и чрез нарушаване целостта на външната бактериална мембрана. Активен е както в логаритмичната, така и в стационарната фаза от развитието на микроорганизмите, като по-висока е активността му във фазата на усилен растеж и в неутрална и леко алкална среда. Ефектът е концентрация-зависим, с ясно изразен постантибиотичен ефект. Активен е срещу почти всички причинители на повърхностни очни заболявания при кучета и котки.

Терапевтични показания

За локално лечение на повърхностни външни бактериални инфекции на окото и неговите помощни органи, предизвикани от чувствителни към действието на тобрамицина патогенни микроорганизми - конюнктивити, блефарити, блефароконюнктивити, кератити, кератоконюнктивити, хордеолуми, дакриоцистити, пълзяща язва на роговицата, вторични инфекции при ерозии и язви на роговицата; профилактично след екстракция на чужди тела от

роговицата и конюнктивата; предоперативно и следоперативно при екстра- и интрабулбарни операции.

Противопоказания за употреба

Да не се прилага при кучета и котки, които са свръхчувствителни или алергични към тобрамицин или към някое от помощните вещества на Тобракулин 0, 3 % капки за очи. Да не се използват други очни капки по време на приложението на Тобракулин. Да не се използва при вирусни и гъбни инфекции на очите.

Странични реакции

Възможни са парене, сърбеж и оток на клепачите, светлостопан или конюнктивална еритема. В такива случаи приложението на препарата се преустановява. При продължително приложение са възможни дисбактериози със свръхнамножаване на нечувствителни микроорганизми, включително гъбички. В такива случаи е наложително подходящо лечение.

Видове животни, за които е предназначен ветеринарномедицинския препарат

Кучета и котки.

Лекарствени и други форми на взаимодействие

Налице е синергизъм *in vivo* между тобрамицина и бета-лактамите антибиотици.

Начин на приложение

Външно в долния конюнктивален сак, като се внимава гутаторът да не се допира до окото и кожата на ръцете. След всяко накапване вътрешният очен ъгъл се притиска за около 30-60 секунди, за да се предотврати изтичането на разтвора през слъзните канали.

Дозировка

При слаба до умерена форма на възпаление се накапват по 1-2 капки на всеки 4 часа. При остри инфекции се накапват по 2 капки на всеки час до подобряване на състоянието, след което се преминава на режим 1-2 капки през 4 часа. Лечението продължава от 5 до 10 дни.

Начин на отпускане

Само по лекарско предписание.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи препаратите на животните

Да се внимава за контаминация на кожата на ръцете поради опасност от сенсibiliзация.

Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползван ВМП или остатъци от него

Съгласно Закона за управление на отпадъците.

Съхранение

На сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25 °С. Да не се замразява. Да се пази на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

3 години.

Срок на годност след първо използване

30 дни при температура под 25 °С.

Номер на лиценза за употреба

№ 657/ 05.12.2006 г.

Производител и притежател на лиценза за употреба

Балканфарма-Разград АД

Бул. „Априлско въстание” № 68

7200 Разград, България

**Проектотикет на
първична опаковка**

Само за ветеринарномедицинска употреба!

TOBRACULIN 0,3 % eye drops, solution

Tobramycin 0,3 % 5 ml

За очно приложение при кучета и котки

ТОБРАКУЛИН 0,3% капки за очи, ратвор

Тобрамицин 0,3 % 5 ml

Партиден №:

Годен до:

**Надписи върху
вторична опаковка**

TOBRACULIN 0,3 % eye drops, solution

Tobramycin 0,3 % 5 ml

Само за ветеринарномедицинска употреба!

За очно приложение при кучета и котки

ТОБРАКУЛИН 0,3% капки за очи, разтвор

Тобрамицин 0,3% 5 ml

Само за ветеринарномедицинска употреба!

За очно приложение при кучета и котки

TOBRACULIN 0,3% eye drops, solution

1 ml съдържа: Tobramycin (като сулфат) 3 mg

Помощни вещества: Benzalkonium chloride,
Potassium dihydrogen phosphate, Disodium
phosphate dodecahydrate, Sodium chloride,
Hydroxyethylcellulose, Purified water.

По лекарско предписание.

Преди употреба прочетете листовката.

ТОБРАКУЛИН 0,3% капки за очи, разтвор

Съхранение: При температура под 25 °С.

Да не се замразява. Срок на годност след първо
използване: 30 дни при температура 25 °С.

Балканфарма-Разград АД

Бул. „Априлско въстание” N° 68, гр. Разград

Рег. №:

Парт.№:

Годен до: