

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

TROXEVASIN[®] gel 2 %

ТРОКСЕВАЗИН[®] gel 2 %

СЪСТАВ

Лекарствено вещество в 1 g гел: 20 mg Troxerutin

Помощни вещества: карбомер, триетаноламин, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Гел 2 %, 40 g в алуминиева туба

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Балканфарма-Троян АД

5600 Троян, ул. "Крайречна" № 1

ДЕЙСТВИЕ

Основната съставка на Троксевазин[®] гел е Троксерутин. Той тонизира стените на съдовете и намалява повишената им пропускливост. Действа противовъзпалително върху околосъдовата тъкан. По този начин намалява отока, подобрява съдовото хранене при различни болестни промени, свързани с венозната недостатъчност.

ПОКАЗАНИЯ

Симптоматично лечение на:

- венозна недостатъчност;
- варикозен и преварикозен синдром;

- повърхностен тромбофлебит, флебит; постфлебитни състояния;
- мускулни крампи;
- в комплексното лечение на хемороидалната болест.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към съставките на продукта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Троксевазин[®] гел не трябва да се нанася върху лигавици, открити рани и екземи.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Няма данни за установени лекарствени взаимодействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ

Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото при използване на продукта.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Приложението на Троксевазин[®] гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА

Засегнатият участък се намазва сутрин и вечер с необходимото количество гел. Втрива се с леки, масажирани движения до пълно резорбиране на продукта. Не оставя миризма и мазни петна по бельото.

При по-тежки случаи се препоръчва комбинирана терапия с Troxevasin® капсули.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

Няма опасност от предозирание поради начина на приложение и голямата терапевтична ширина на продукта. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо да се приложат общи мерки за извеждане от организма (средства, предизвикващи повръщане) и прилагане на симптоматично лечение. При необходимост лечението продължава в болнично заведение.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ЕФЕКТИ

След прилагане на Троксевазин® гел много рядко се наблюдават реакции на кожно дразнене - зачервяване, сърбеж, кожни обриви. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

СЪХРАНЕНИЕ

На защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се замразява!

СРОК НА ГОДНОСТ

Пет (5) години

Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ

Февруари 2002 год.