

## **ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

**SIRACOL®**

**СИРАКОЛ**

### **СЪСТАВ**

Лекарствено вещество в ml: Guaiacolsulfonate 60,4 mg

Помощни вещества: захароза, етанол, портокалова есенция, пречистена вода

### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Siracol® сироп 140 ml в стъклени бутилки или в бутилки от полиетилентерефталат, мерителна лъжичка от 5 ml

### **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Балканфарма-Троян АД,

5600 Троян, ул. Крайречна № 1

### **ДЕЙСТВИЕ**

Сиракол действа отхрачващо по два начина в зависимост от дозата. В малки дози втечнява бронхиалния секрет и спомага за отлепването му от бронхиалната стена. Улеснява отхрачването чрез усилване на бронхиалната перисталтика. В големи дози предизвиква намаляване на бронхиалния секрет (ако е увеличен) и действа изсушаващо на бронхиалната лигавица.

Продуктът има и известен противовъзпалителен ефект, който се обяснява с механизма му на излъчване през белите дробове.

## **ПОКАЗАНИЯ**

Продуктът се прилага за симптоматично лечение на кашлица при:

- Фаринготрахеити (възпаления на гълтача и трахеята);
- остри и хронични бронхити;
- бронхиектазии (разширение на бронхите).

## **ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Свръхчувствителност към лекарственото или към някое от помощните вещества, включени в състава на продукта; кръвохрак; заплашващ или съществуващ белодробен оток.

### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

Да се употребява с внимание при пациенти с язва на стомаха и/или на дванадестеопръстника.

Може да промени или засили действието на други лекарства.

### **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Сиракол може да се прилага едновременно с антибиотици, химиотерапевтици, антипиретици и витамини.

### **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

Не се прилага по време на бременност и в периода на кърмене.

### **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

## **ДАНИИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Готовият продукт съдържа *етанол*, поради което представлява опасност за страдащите от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и за бременни и деца.

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА**

### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА**

*Възрастни:* по 3 мерителни лъжички (15 ml), 3-4 пъти дневно;

*Деца от 6 до 14 години:* по 1 мерителна лъжичка (5 ml), 2-3 пъти дневно;

*Деца от 2 до 6 години:* по ½ мерителна лъжичка (2,5 ml), 2-3 пъти дневно.

При необходимост от продължително лечение (повече от 4-5 дни) продуктът се прилага по лекарско предписание.

### **ПРЕДОЗИРАНЕ**

При предозирание могат да се наблюдават гадене и повръщане, мускулна слабост, парализа на вазомоторните центрове и сърдечно-съдов и дихателен колапс.

Лечение – предизвиква се повръщане, прилагат се стомашна промивка и симптоматично лечение.

### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Възможно е да се наблюдава дразнене от страна на стомашно-чревния тракт, което се изразява в гадене и повръщане. В много редки случаи могат да се срещнат парене в устата, гърлото и стомаха. При високи дози може да причини мускулна слабост, парализа на някои мозъчни центрове и сърдечно-съдов колапс.

## **СЪХРАНЕНИЕ**

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25<sup>0</sup>С.

След отваряне на опаковката е годен за употреба 30 дни, при същите условия на съхранение.

## **СРОК НА ГОДНОСТ**

2 (две) години от датата на производство

## **ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ**

Юли 2002 год.