

ТОБРАКУЛИН-Д капки за очи, суспенсия

TOBRACULIN-Deye drops, suspension

Състав

В 1 ml суспенсия се съдържат: Tobramycin (като сулфат) 3 mg и Dexamethasone 1 mg.

Действие

АТС vet Code: Q S 0 1 C A 0 1.

Тобракулин-Д капки за очи, суспенсия включва тобрамицин и дексаметазон. Тобрамицинът е антибиотик от групата на аминогликозидите с широк спектър на антибактериално действие. Активен е предимно срещу Грам-отрицателни и някои Грам-положителни аеробни микроорганизми – *Escherichia coli*, *Pseudomonas*, *Proteus*, *Klebsiella*, *Shigella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Providentia*, *Citrobacter*, *Staphylococcus aureus* и др. Действа бактерицидно чрез инхибиране на белтъчния синтез на рибозомно равнище и чрез нарушаване целостта на бактериалната стена. Ефектът е концентрация-зависим, с ясно изразен постантибиотичен ефект. Активен е срещу почти всички причинители на повърхностни очни заболявания при кучета и котки.

Дексаметазонът е синтетичен гликокортикоид – метилно производно на флуорпреднизолон. Употребата му в офталмологичната практика се базира на неговите ясно изразени противовъзпалителни, антиалергични и имunosупресивни свойства. Инхибира активността на всички ендогенни медиатори на възпалителния процес и потиска всички етапи на възпалителния отговор, независимо от причините – травматични, термични, химични, инфекциозни, алергични и др. Действа още локално анестетично и противосърбящо. След накапване прониква добре в епитела на роговицата и склерата, в клетките на конюнктивите и в предната очна камера.

Терапевтични показания

Препаратът се прилага при възпалителни състояния на конюнктивата, роговицата и предната очна камера, при които се препоръчва употребата на тобрамицин и кортикостероиди и е налице повърхностна бактериална инфекция или съществува риск от нея - конюнктивити, кератити, кератоконюнктивити, блефарити, блефароконюнктивити, хордеолуми, дакриоцистити, ирит, иридоциклит, след екстракция на чужди тела, предоперативно и следоперативно при екстра- и интрабулбови операции.

Противопоказания за употреба

Да не се прилага при кучета и котки, които са чувствителни или алергични към някое от активните или помощните вещества на Тобракулин-Д. Да не се използва при вирусни и гъбни инфекции на очите. Да не се използват други очни капки или унгвенти по време на лечението с Тобракулин-Д.

Странични реакции

Сериозни нежелани странични ефекти при употребата на Тобракулин-Д не се наблюдават. Възможни са парене, сърбеж и оток на клепачите, светлостойност или конюнктивална еритема. В такива случаи приложението на препарата се преустановява. При продължителна употреба са възможни дисбактериози със свръхнамножаване на нечувствителни на тобрамицин микроорганизми, включително гъбички. В такива случаи се провежда подходящо лечение. Може да се наблюдава забавено зарастване на очните дефекти, както и повишаване на вътреочното налягане.

Видове животни, за които е предназначен ветеринарномедицинския препарат

Кучета и котки.

Лекарствени и други форми на взаимодействие

Не са известни лекарствени и други форми на взаимодействие.

Начин на приложение

Преди употреба флаконът се разклаща енергично. Прилага се чрез накапване в долния конюнктивален сак, като се внимава откапващото приспособление да не се допира до окото и кожата на ръцете. След всяко накапване вътрешния ъгъл на окото се притиска за около 30 - 60 секунди, за да се предотврати изтичане на суспензията през слъзните канали.

Дозировка

Прилагат се обикновено по 1 - 2 капки на всеки 4 – 6 часа. При остри възпаления лечението може да започне с 1 - 2 капки на всеки 2 часа през първите 24 – 48 часа и постепенно, успоредно с подобряване на клиничните симптоми, се преминава на режим 1 - 2 капки на всеки 4 – 6 часа. Лечението продължава от 5 до 10 дни.

Начин на отпускане

Само по лекарско предписание.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи препарата на животните

При работа с препарата да се внимава за контаминация на кожата на ръцете поради опасност от сенсibiliзация.

Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползван препарат или остатъци от него, ако има такива

Празните опаковки, неизползван продукт или продукт с изтекъл срок на годност се унищожават съгласни изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Съхранение

На сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под

25 °C. Да не се замразява. Да се пази на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първо използване

28 дни при температура под 25 °C.

Номер на лиценза за употреба

№ 658/ 05.12.2006 г.

Производител и притежател на лиценза за употреба

Балканфарма-Разград АД

Бул. „Априлско въстание” N° 68

7200 Разград, България

**Проектоетикет на
първична опаковка**

Само за ветеринарномедицинска употреба!

TOBRACULIN 0,3 % eye drops, solution

Tobramycin 0,3 % 5 ml

За очно приложение при кучета и котки

ТОБРАКУЛИН 0,3% капки за очи, ратвор

Тобрамицин 0,3 % 5 ml

Партиден №:

Годен до:

**Надписи върху
вторична опаковка**

TOBRACULIN 0,3 % eye drops, solution

Tobramycin 0,3 % 5 ml

Само за ветеринарномедицинска употреба!

За очно приложение при кучета и котки

ТОБРАКУЛИН 0,3% капки за очи, разтвор

Тобрамицин 0,3 % 5 ml

Само за ветеринарномедицинска употреба!

За очно приложение при кучета и котки

TOBRACULIN 0,3 % eye drops, solution

1 ml съдържа: Tobramycin (като сулфат) 3 mg

Помощни вещества: Benzalkonium chloride,
Potassium dihydrogen phosphate, Disodium
phosphate dodecahydrate, Sodium chloride,
Hydroxyethylcellulose, Purified water.

По лекарско предписание.

Преди употреба прочетете листовката.

ТОБРАКУЛИН 0,3% капки за очи, разтвор

Съхранение: При температура под 25 °C.

Да не се замразява. Срок на годност след първо

използване: 30 дни при температура 25 °C.

Балканфарма-Разград АД

Бул. „Априлско въстание”N° 68, гр. Разград

Рег. №:
Парт.№:
Годен до: