

## **ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

**EFISOL**<sup>®</sup>

**ЕФИЗОЛ**

### **СЪСТАВ**

Лекарствени вещества в една таблетка за смучене: Dequalinum chloride 0,25 mg;

Ascorbic acid 30 mg;

Помощни вещества: монохидратна глюкоза, натриев захарин, пектин, ванилин, сукроза, какао, монохидратна лактоза, магнезиев стеарат.

### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Таблетка за смучене, по 20 броя в блистери от PVC/ал. фолио, 1 блистер в единична картонена кутия.

### **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

"Балканфарма - Дупница" АД

гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе" №3 п.к. 2600

тел. (0701) 2-42-81/2-90-21/29

факс (0701) 2-42-81/82; 2-81-62

### **ДЕЙСТВИЕ**

Ефизол действа локално антисептично, нарушава развитието на различни видове микроорганизми особено гноеродни причинители, включително и някои нечувствителни спрямо антибиотици щамове. Притежава и противогъбична активност (кандида, някои епидермофити и трихофити). Разрушава причинителите на инфекции като повлиява образуването на белтъците, ензими и уврежда клетъчните им мембрани.

Аскорбинова киселина (вит С) уплътнява стените на кръвоносните съдове, намалява пропускливостта им, възможността за кървене и образуване на оток. Притежава противовъзпалителен ефект.

## **ПОКАЗАНИЯ**

За локално антисептично лечение на леки възпалителни процеси в устната кухина и гърлото, предизвикани от чувствителни спрямо продукта причинители (катарални, улцерозни, фибринозни гингивити, афтозни стоматити, кандидоза /соор/, фарингити, тонзилити, ларингити и глосити).

За профилактика на инфекции преди и следоперативни интервенции в областта устата и гърлото.

В комплексното лечение съвместно с антибиотици или сулфонамиди при по-сериозни инфекции на орофаринкса.

## **ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Свръхчувствителност към лекарствените и/или помощните вещества на продукта

### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

Поради липсата на обезболяваща компонента в продукта не е уместно приложението му при възпалителни процеси, съпроводени със силна болезненост. При наличие на основни клинични симптоми за разпространение на инфекцията е необходимо и назначаване на системно противобактериално лечение. При появата на каквито и да е нежелани ефекти, приемът на Ефизол се преустановява и се назначава друг вид лечение. Едновременната употреба с други продукти за локално приложение се извършва внимателно и след преценка от страна на лекуващия лекар.

Въпреки ниското съдържание на захари употребата на продукта при диабетици трябва да се извършва с внимание при контролиране стойностите на кръвната захар.

Ако не настъпи подобрене или има задълбочаване на симптоматиката е необходима консултация с лекар.

## **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Няма данни за лекарствени и други взаимодействия.

Съществува вероятност при едновременно приложение с Kayexalate (продукт, който се прилага при повишени нива на калия в кръвта) да се получат тежки некротични увреждания на кожата и лигавиците особено в стомашно - чревния тракт.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ**

Продуктът не е подходящ при деца под 4 годишна възраст поради риск от попадане на таблетките в дихателните пътища.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ**

Поради ниската си токсичност и липса на сериозни странични ефекти може да се назначава по време на бременност и в периода на кърмене.

## **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Няма данни за неблагоприятно влияние върху вниманието, концентрацията и двигателните реакции.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

### **ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Прилага се по 1 таблетка за смучене през 2-3 часа (не повече от 8-10 таблетки за 24 часа).

Таблетките не се дъвчат. Половин час след приемането им пациентът е необходимо да се въздържа от приемане на храна и течности.

Препоръчва се лечението да продължи 1-2 дни след отзвучаване на симптомите на заболяването. Общата продължителност на лечението не трябва да надвишава 5-7 дни (опасност от нарушаване развитието на нормалната бактериална флора в устната кухина и гърлото).

### **ПРЕДОЗИРАНЕ**

Няма данни за предозирание с продукта.

### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Продуктът се понася добре, не дразни тъканите и няма съобщения за сериозни нежелани ефекти. Рядко може да предизвика гадене и позиви за повръщане; много рядко алергични реакции, чувство за парене и дразнене или сухота в устната кухина; нарушаване развитието на нормалната бактериална флора в устната кухина при продължителна употреба.

### **СЪХРАНЕНИЕ**

Съхранява се на сухо и защитено от светлина място при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

### **СРОК НА ГОДНОСТ**

3 (три) години от датата на производството.

### **ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА**

Юни 2002 год