

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**TROXEVASIN<sup>®</sup> caps 300mg**

**ТРОКСЕВАЗИН<sup>®</sup> caps 300mg**

### **СЪСТАВ:**

Всяка капсула съдържа Трохерутин 300 mg;

помощни вещества: магнезиев стеарат, лактоза монохидрат, оцветители (E110, E104 и E171) и желатин в състава на капсулната обвивка.

### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА**

Твърди капсули, по 10 броя в блистер, 5 блистера в картонена кутия

### **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Балканфарма-Троян АД

5600 Троян, ул. “Крайречна” № 1

### **ДЕЙСТВИЕ**

**Троксевазин**<sup>®</sup> твърди капсули съдържа троксерутин.

Той намалява повишената пропускливост на капилярите и действа върху венозната стена. Има противовъзпалителен ефект върху тъканите около нея. Стабилизира капилярите и има известен ефект, предотвратяващ образуването на съсиреци. Намалява отока, подобрява тъканното хранене и повлиява благоприятно различните увреждания, свързани с венозната недостатъчност.

### **ПОКАЗАНИЯ**

**Троксевазин**<sup>®</sup> се прилага за лечение на разширени вени и свързаните с това усложнения – възпаление на вените, образуване на съсиреци (тромби), поява на язви или възпаление на кожата; хемороидална болест.

**Троксевазин**<sup>®</sup> е подходящ в комбинираното лечение на контузии,

разтягане на сухожилия, изкълчвания и болезнени гърчове на отделни мускули (т.нар. мускулни крампи), оток и болки при травми и варикозни вени; варикозен дерматит.

**Троксевазин**<sup>®</sup> е подходящ за лечение на ретинопатия – заболяване на ретината на очите, вследствие диабет, хипертония и др.

### **ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

**Троксевазин**<sup>®</sup> е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към троксерутин или към някое от помощните вещества.

#### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА**

**Троксевазин** се приема по време на хранене, тъй като дразни стомашната лигавица.

#### **ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Няма данни за установени лекарствени взаимодействия.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате други лекарства. Някои от тях може да са несъвместими с **Троксевазин**<sup>®</sup>, а за други да е необходима корекция на дозата.

#### **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ**

Продуктът се прилага с особено внимание при пациенти с тежки чернодробни или жлъчни заболявания. При наличие на някое от тези заболявания, информирайте Вашия лекар.

Няма данни за влиянието на лекарствения продукт по време на бременността и кърменето, затова е необходимо да се прилага с внимание при такива пациенти.

## **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

**Троксевазин**<sup>®</sup> не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

## **ДАНИИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Продуктът съдържа лактоза, което го прави неподходящ за употреба при хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.

Поради наличието на оцветяващи агенти (E110), лечението с продукта може да причини алергичен тип реакции, включително астма. Рискът от алергии е по-голям при алергични към аспирин пациенти.

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА**

### **ДОЗИРОВКА**

**Троксевазин**<sup>®</sup> капсули се прилагат по време на хранене.

Обичайната доза е по 2 капсули дневно, в продължение на 3-4 седмици; за поддържащо лечение - по 1 капсула дневно в продължение на 3-4 седмици.

Лечението може да се проведе комбинирано с **Троксевазин**<sup>®</sup> гел по указание на лекуващия лекар. Успехът на лечението с **Троксевазин**<sup>®</sup> зависи от редовното му приемане в подходящи дози за продължителен период от време.

Обикновено лечението продължава 3 - 4 седмици, но при по-тежки случаи времето за лечение се удължава. Не прекратявайте приема при първите симптоми на подобрене!

### **НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ**

Моля уведомете лекуващия Ви лекар!

Най-честите симптоми на предозирание на препарата са гадене, повръщане, диария, коремни болки. За извеждане на наличните количества се

използват предизвикващи повръщане лекарства. Прилага се симптоматично лечение, а при необходимост се извършва перитонеална диализа.

## **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

При лечение с **Троксевазин**<sup>®</sup> капсули рядко се наблюдават нежелани лекарствени реакции. От страна на стомашно-чревния тракт може да се появи гадене, повръщане, диария. Възможни са кожно-алергични реакции – обриви и сърбеж; в редки случаи - главоболие и нарушение на съня.

Тези странични реакции, обикновено са преходни и отзвучават след прекратяване приема на продукта.

При възникване на тези или други нежелани реакции, дори и такива, които не са отбелязани в тази листовка и предполагате, че са резултат от лечението с **Троксевазин**<sup>®</sup>, моля информирайте лекуващия Ви лекар.

## **СЪХРАНЕНИЕ**

Съхранява се на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

## **СРОК НА ГОДНОСТ**

Пет (5) години.

## **ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА**

Декември, 2001г.