



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Мусонафин® Миконафин®

ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА, ЗАЩОТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ!

Този лекарствен продукт се отпуска без рецепта. Въпреки това Вие трябва да използвате Миконафин крем внимателно, за да получите най-добри резултати от лечението.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от повече информация, обърнете се към фармацевт или лекар за съвет.

- Консултирайте се с лекар ако Вашите оплаквания се влошат или нямат подобрение след 7-дневно лечение!

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво е Миконафин крем и за какво се прилага
2. С какво да се съобразите преди да прилагате Миконафин крем
3. Как да прилагате Миконафин крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Миконафин крем
6. Друга информация

Миконафин крем 1%
Тербинафинов хидрохлорид
Лекарствено вещество: 1 g крем съдържа Тербинафинов хидрохлорид 10 mg
Помощни вещества: стеарилов алкохол, цетилов алкохол, сорбитанов стеарат, цетилов палмитат, изопропилмиристат, бензилов алкохол, полисорбат 60, натриев хидроксид, пречистена вода.

Опаковка:
Мусонафин 1% крем в туби по 15 g и 30 g.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Актавис ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

ПРОИЗВОДИТЕЛ
NextPharma (PHARBIL Waltrop GmbH)
Im Wirriggen 25
D-45731 Waltrop
Germany

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИКОНАФИН КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА?

Миконафин е противогъбичен продукт с широк спектър на действие. В ниски концентрации той унищожава дерматофити, плесени и определени гъби.

Миконафин се прилага за лечение на:

- Кожни гъбични инфекции, причинени от Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis and Epidermophyton floccosum; при tinea pedis (athletes foot), tinea cruris, tinea corporis;
- Инфекции на кожата, причинени от дрожди от рода Candida (C. albicans);
- Pityriasis (tinea) versicolor, причинен от Pityrosporum orbiculare (познат още като Malassezia furfur).

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С МИКОНАФИН КРЕМ

Миконафин крем не се прилага при пациенти със свръхчувствителност към лекарственото вещество или някое от помощните вещества.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Миконафин крем се прилага само външно върху кожата. Необходимо е да се избягва контакт с очите.

Приложение на Миконафин и прием на
храни и напитки
Продуктът е за приложение върху кожата.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени
продукти се консултирайте с лекуващия Ви
лекар или с фармацевт!

Няма клиничен опит при бременни жени. По тази причина продуктът не се прилага по време на бременност.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени
продукти се консултирайте с лекуващия Ви
лекар или с фармацевт!

По време на кърменето продуктът не трябва да се прилага, тъй като се отделя в майчиното мляко.

Шофиране и работа с машини

Миконафин крем не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар!

Не са известни взаимодействия с Миконафин крем.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА МИКОНАФИН КРЕМ

Прилагайте Миконафин крем точно както е посочено в тази листовка!

Възрастни и деца над 12 години

Продължителност на лечението:

Tinea corporis, cruris - 1 до 2 седмици

Tinea pedis - 1 седмица

Кожна кандидиоза - 2 седмици

Pityriasis versicolor - 2 седмици

Миконафин се прилага веднъж или два пъти дневно върху предварително почистени области. Кремът се нанася на тънък слой върху засегнатите участъци и леко се разтрива. В случаи на интертригинозни инфекции (между пръстите, в гънките на седалищните области, в слабините) върху него може да се наложи марлена превръзка, особено през нощта.

Облекчаване на симптомите настъпва обикновено няколко дни след началото на лечението. При нередовна употреба или преждевременно прекратяване на лечението съществува риск от рецидив. Ако след двуседмично лечение няма симптоми на подобрение се налага преоценка на поставената диагноза.

Деца

Опитът за лечение на деца с продукта е ограничен и не се препоръчва прилагането му в тази възраст.

Пациенти в напреднала възраст

Няма данни при възрастни пациенти да се налага прилагане на друга дозировка.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Миконафин е по-силен от

очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт!

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

Няма данни за предозиране с продукта. Ако продуктът е погълнат по невнимание трябва да се приложи изпразване на стомаха.

Ако сте пропуснали да приложите Миконафин крем:

Ако сте пропуснали да приложите поредната доза, приложете я час по-скоро.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства и Миконафин крем има нежелани реакции.

Рядко върху мястото на намазването могат да се наблюдават зачервяване, дразнене или сърбеж. Обикновено това не изисква прекратяване на лечението. Тези симптоми трябва да бъдат отличени от алергична реакция, което се случва рядко и се състои в пруритус, обрив, булозни ерупции и уртикария и изисква прекъсване на терапията.

Ако забележите нежелани реакции, които не са посочени в тази листовка, моля информирайте своя лекар или фармацевт!

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Без специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца! Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 3 (три) години
Срок на годност след първо отваряне на опаковката – 6 (шест) месеца

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба:

Актавис ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста –
Август 2008 г.



B1172