

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ALMADRAT[®] T

АЛМАДРАТ[®] T

СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа Magaldrate 500 mg.

Помощни вещества: манитол, сорбитол, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

24 броя таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 1 блистер в картонена кутия; по 3 блистера в картонена кутия.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Балканфарма-Троян АД, 5600 Троян, България, ул. “Крайречна” № 1.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Балканфарма-Дупница АД, Самоковско шосе 3, 2600 Дупница.

ДЕЙСТВИЕ

АЛМАДРАТ[®] T е антиацидно лекарство, което неутрализира повишената стомашна киселинна секреция във физиологични граници, без да пречи на храносмилането. Същевременно той образува тънък защитен слой, който покрива възпалената лигавица, ерозивните и язвени дефекти на същата и я предпазва от агресивното действие на стомашната солна киселина, дразнещи храни и лекарства.

Лекарството облекчава бързо стомашната болка и усещането на парене и киселини.

ПОКАЗАНИЯ

АЛМАДРАТ® Т се прилага при: различни болестни състояния, протичащи с болка в стомаха, парене и чувство за "киселини" зад гръдната кост; гастрит; язвена болест; функционални разстройства на стомаха (т. н. "нервен стомах"); "раздразнен стомах", предизвикан от дразнещи стомашната лигавица храни, напитки и лекарства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

АЛМАДРАТ® Т не се прилага при:

- ✓ болни с бъбречна недостатъчност и такива на хемодиализа, поради риск от достигане на токсични концентрации на алуминиеви и магнезиеви йони в кръвта на болните;
- ✓ данни за непоносимост към магалдрат или сорбитол.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

При максимална дозировка в редки случаи се среща диария.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

При необходимост АЛМАДРАТ® Т може да се приема заедно с други лекарствени продукти. В тези случаи лекарствата трябва да се приемат поотделно през интервал от 1-2 часа.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Няма данни за прилагане на магалдрат при деца, а опитът от приложението му при бременни и кърмещи жени е малък.

АЛМАДРАТ® Т не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини, изискващи повишено внимание.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

✓ при активна язвена болест се приемат по 2 таблетки 1 час след хранене, 3 пъти дневно и 2 таблетки вечер преди сън (максималната дневна доза е по 2 таблетки 4 пъти дневно). Продължителността на лечебния курс е не по-малко от един месец, независимо от бързото повлияване на язвените симптоми. Този срок е необходим за зарастване на язвата.

✓ при "нервен стомах", "раздразнен стомах" и леки форми на гастрит се приемат по 1-2 таблетки дневно. При нужда тази доза може да се приема 3-4 пъти дневно, един или няколко дни.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

4 (четири) години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката!

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ

м. октомври, 2001 г.